

Quizz VIH

Pré-test

1. On estime en France le nombre de personnes porteuses du VIH à : (affirmation vrai)

A. 60 500

B. 153 000

C. 203 400

2. Le VIH peut être transmis: (affirmations vrai)

- A. Pendant l'allaitement
- B. Au cours d'une fellation
- C. En embrassant une personne
- D. Suite à un rapport avec une personne vivant avec le VIH, indétectable depuis environ 1 an

3. Le traitement préventif de l'infection par le VIH s'appelle: (affirmation vrai)

- A. Le TASP
- B. Le TPE
- C. La PrEP
- D. Le CaRE

4. Le résultat du test de dépistage du VIH est certain à partir de : (affirmation vrai)

- A. 48h après la prise de risque
- B. 15 jours après la prise de risque
- C. 6 semaines après la prise de risque
- D. 8 semaines après la prise de risque

5. Les antirétroviraux (ARV) : (affirmations vrai)

- A. Se prennent toujours en association de plusieurs molécules sous forme de trithérapie
- B. Guérissent le VIH
- C. Doivent se prendre systématiquement tous les jours pour toute la vie
- D. Permettent à une personne vivant avec le VIH d'avoir des rapports sexuels sans préservatif immédiatement après une seule prise
- E. Peuvent être prescrit à une personne non infectée par le VIH

6. Le Traitement Post Exposition peut être prescrit: (affirmations vrai)

- A. Idéalement dans les 4 heures suivant une prise de risque
- B. Le lendemain d'une prise de risque
- C. A une femme enceinte
- D. A une personne mineure

7. Le TASP : (affirmations vrai)

- A. Fait référence au fait de prendre des antirétroviraux avant un rapport sexuel pour éviter tout risque de transmission du VIH
- B. Concerne uniquement les personnes vivant avec le VIH
- C. N'est pas systématiquement proposé à une personne vivant avec le VIH
- D. Est toujours introduit immédiatement après une découverte de séropositivité VIH

8. Citez toutes les possibilités faisant parties de la prévention diversifiée du VIH ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

9. La PrEP: (affirmations vrai)

- A. Peut être uniquement prescrite par un infectiologue
- B. Est un dispositif protégeant des IST
- C. Peut être prescrite à une femme cisgenre en continu
- D. Est contre indiquée en discontinu chez les personnes porteuses d'une hépatite B chronique

10. Le dépistage du VIH: (affirmations vrai)

- A. Est à proposer uniquement aux personnes prenant des risques
- B. Peut être réalisé par une personne sans ordonnance
- C. Nécessite obligatoirement l'accord de la personne pour être réalisé
- D. Est à réaliser tous les 3 mois pour une personne sous PrEP

Quizz VIH

Post-test

On estime en France le nombre de personnes porteuses du VIH à : (affirmation vrai)

A. 60 500

B. 153 000

C. 203 400

On estime en France le nombre de personnes porteuses du VIH à : (affirmation vrai)

A. 60 500

B. 153 000

C. 203 400

Le VIH peut être transmis: (affirmations vrai)

- A. Pendant l'allaitement
- B. Au cours d'une fellation
- C. En embrassant une personne
- D. Suite à un rapport avec une personne vivant avec le VIH, indétectable depuis environ 1 an

Le VIH peut être transmis: (affirmations vrai)

- A. Pendant l'allaitement
- B. Au cours d'une fellation
- C. En embrassant une personne
- D. Suite à un rapport avec une personne vivant avec le VIH, indétectable depuis environ 1 an

Le traitement préventif de l'infection par le VIH s'appelle: (affirmation vrai)

- A. Le TASP
- B. Le TPE
- C. La PrEP
- D. Le CaRE

Le traitement préventif de l'infection par le VIH s'appelle: (affirmation vrai)

A. Le TASP

B. Le TPE

C. La PrEP

D. Le CaRE

Le résultat du test de dépistage du VIH est certain à partir de : (affirmation vrai)

- A. 48h après la prise de risque
- B. 15 jours après la prise de risque
- C. 6 semaines après la prise de risque
- D. 8 semaines après la prise de risque

Le résultat du test de dépistage du VIH est certain à partir de : (affirmation vrai)

- A. 48h après la prise de risque
- B. 15 jours après la prise de risque
- C. 6 semaines après la prise de risque
- D. 8 semaines après la prise de risque

Les antirétroviraux (ARV) : (affirmations vrai)

- A. Se prennent toujours en association de plusieurs molécules sous forme de trithérapie
- B. Guérissent le VIH
- C. Doivent se prendre systématiquement tous les jours pour toute la vie
- D. Permettent à une personne vivant avec le VIH d'avoir des rapports sexuels sans préservatif immédiatement après une seule prise
- E. Peuvent être prescrit à une personne non infectée par le VIH

Les antirétroviraux (ARV) : (affirmations vrai)

- A. Se prennent toujours en association de plusieurs molécules sous forme de trithérapie
- B. Guérissent le VIH
- C. Doivent se prendre systématiquement tous les jours pour toute la vie
- D. Permettent à une personne vivant avec le VIH d'avoir des rapports sexuels sans préservatif immédiatement après une seule prise
- E. Peuvent être prescrit à une personne non infectée par le VIH

Le Traitement Post Exposition peut être prescrit: (affirmations vrai)

- A. Idéalement dans les 4 heures suivant une prise de risque
- B. Le lendemain d'une prise de risque
- C. A une femme enceinte
- D. A une personne mineure

Le Traitement Post Exposition peut être prescrit: (affirmations vrai)

- A. Idéalement dans les 4 heures suivant une prise de risque
- B. Le lendemain d'une prise de risque
- C. A une femme enceinte
- D. A une personne mineure

Le TASP : (affirmations vrai)

- A. Fait référence au fait de prendre des antirétroviraux avant un rapport sexuel pour éviter tout risque de transmission du VIH
- B. Concerne uniquement les personnes vivant avec le VIH
- C. N'est pas systématiquement proposé à une personne vivant avec le VIH
- D. Est toujours introduit immédiatement après une découverte de séropositivité VIH

Le TASP : (affirmations vrai)

- A. Fait référence au fait de prendre des antirétroviraux avant un rapport sexuel pour éviter tout risque de transmission du VIH
- B. Concerne uniquement les personnes vivant avec le VIH
- C. N'est pas systématiquement proposé à une personne vivant avec le VIH
- D. Est toujours introduit immédiatement après une découverte de séropositivité VIH

Citez toutes les possibilités faisant parties de la prévention diversifiée du VIH ?

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

Citez toutes les possibilités faisant parties de la prévention diversifiée du VIH ?

- A. La PrEP
- B. Le Dépistage
- C. La RDR
- D. Le préservatif
- E. Le TASP
- F. Le TPE

La PrEP: (affirmations vrai)

- A. Peut être uniquement prescrite par un infectiologue
- B. Est un dispositif protégeant des IST
- C. Peut être prescrite à une femme cisgenre en continu
- D. Est contre indiquée en discontinu chez les personnes porteuses d'une hépatite B chronique

La PrEP: (affirmations vrai)

- A. Peut être uniquement prescrite par un infectiologue
- B. Est un dispositif protégeant des IST
- C. Peut être prescrite à une femme cisgenre en continu
- D. Est contre indiquée en discontinu chez les personnes porteuses d'une hépatite B chronique

Le dépistage du VIH: (affirmations vrai)

- A. Est à proposer uniquement aux personnes prenant des risques
- B. Peut être réalisé par une personne sans ordonnance
- C. Nécessite obligatoirement l'accord de la personne pour être réalisé
- D. Est à réaliser tous les 3 mois pour une personne sous PrEP

Le dépistage du VIH: (affirmations vrai)

- A. Est à proposer uniquement aux personnes prenant des risques
- B. Peut être réalisé par une personne sans ordonnance
- C. Nécessite obligatoirement l'accord de la personne pour être réalisé
- D. Est à réaliser tous les 3 mois pour une personne sous PrEP