



Epidémiologie Région Occitanie


Données 2021

Présentation réalisée par Mme Meftah Nadia, data manager du COREVIH Occitanie à partir des données provenant du logiciel de spécialité Nadis installé dans la plupart des établissements hospitaliers d'Occitanie et avec la participation active des Techniciens d'Etudes Cliniques.

Répartition de la file active prise en charge dans la population hospitalière, en Occitanie



(à partir de la Base Nadis : N=9191)

La file active VIH se définit par le nombre de patients en situation de suivi au 31 décembre de l'année étudiée dans les centres hospitaliers de la région utilisant Nadis et ayant eu au moins une consultation.



*Perpignan**
 = file active du CH Perpignan (= 1041 patients)
 + file active du CH Narbonne (= 16 patients)

Comparaison de la file active des patients VIH prise en charge dans la population hospitalière, en Occitanie




En 2021, la file active en Occitanie est approximativement identique à celle de 2018 et 2019.

On constate néanmoins coté Occitanie Ouest (ex Midi Pyrénées) que les files actives des patients ont augmenté dans les centres de Rodez (+16), Tarbes(+6), Albi (+16), Cahors (+12) au détriment des centres de Toulouse (-81) par rapport à 2019.

Du Coté Occitanie Est (ex Languedoc Roussillon), la file active du CHU de Montpellier a diminué (-47), à contrario celle du CHU de Nîmes a augmenté (+ 43) et celle de Béziers aussi (+17), les autres centres étant restés stables.


Répartition en fonction du sexe

(à partir de la Base Nadis : N=9191)




Comparaison Occitanie Est / Occitanie Ouest en fonction du sexe

(à partir de la Base Nadis : N=9191)




Rappel : 71,52% hommes et 28,04% femmes en Occitanie



* Oc = Occitanie


Répartition en fonction de l'âge et du sexe en Occitanie

(à partir de la Base Nadis : N= 9191)




Répartition en fonction de l'âge

(à partir de la Base Nadis : N= 9191)



Répartition en fonction du mode de contamination probable en Occitanie


(à partir de la Base Nadis : N= 9191)



Autres * = transmission materno-fœtal, hémophile, transfusion


Répartition en fonction du mode de contamination probable

(à partir de la Base Nadis : N= 9191)




Autres * =
transmission
materno-fœtal,
hémophile,
transfusion


Comparaison en fonction du mode de contamination probable, en Occitanie, sur les 4 dernières années



Répartition en fonction du pays de naissance de la populations suivie (à partir de la Base Nadis : N= 9191)




Représentation de la coinfection hépatite en Occitanie (à partir de la Base Nadis : N= 9191)



Dans la file active Occitanie, il y a 1737 patients coinfectés hépatites; ceux qui représente 18,9% des patients suivis

Cascade de la prise en charge dans les soins, en 2021 en Occitanie



Définition :


La cascade de la prise en charge dans les soins représente l'écart entre le nombre de personnes dépistées qui sont venues consulter dans un service de soins (1° colonne), le nombre de celles qui restent dans le système de soins (2° colonne), le nombre de celles qui prennent un traitement depuis plus de 6 mois (3° colonne) et le nombre de celles qui ont un traitement efficace (4° colonne)*.

L'écart entre la 1° et la 4° colonne révèle les efforts à faire pour obtenir que toutes les personnes séropositives (à qui un traitement est proposé dès le diagnostic connu) aient une charge virale indétectable = succès thérapeutique.


Répartition des nouveaux diagnostiqués VIH en fonction :

(à partir de la Base Nadis : N=178)

- Du sexe




- De leur statut au moment de la prise en charge




En comparaison :

- En Primo Infection en 2019 ~ 20%; en 2020 : 12%
- Au Stade SIDA en 2019: 15%; en 2020 14%

Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction de l'âge (à partir de la Base Nadis : N=178)




Occitanie




Rq : Coté Occitanie Ouest , 54,9% des patients nouveaux diagnostiqués ont moins de 40 ans

Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction du mode de contamination probable

(à partir de la Base Nadis : N=178)





Occitanie



Autre * = transmission materno-foetal, hémophile, transfusion


Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction du pays de naissance

(à partir de la Base Nadis : N=178)




Autres * = Amériques, Océanie, Europe, Moyen-Orient, Asie

Comparaison de la file active des patients nouvellement diagnostiqués VIH, en Occitanie



Baisse constatée en 2020 : effet COVID(Confinement)? prévention : Prep ?

Comparatif de la répartition des patients nouvellement diagnostiqués VIH, par département



MERCI DE VOTRE ATTENTION