




COREVIH
Occitanie

Epidémiologie année 2019

Répartition de la file active prise en charge dans la population hospitalière


(à partir de la Base Nadis : N= 9211)



La file active VIH se définit par le nombre de patients en situation de suivi au 31 décembre de l'année étudiée dans les centres hospitaliers de la région utilisant Nadis et ayant eu au moins une consultation..


Répartition de la file active prise en charge dans la population hospitalière par département

(à partir de la Base Nadis : N= 9211)




Répartition en fonction du sexe

(à partir de la Base Nadis : N=9211)




Répartition en fonction de l'âge

(à partir de la Base Nadis : N= 9211)




Répartition en fonction de l'âge par département

(à partir de la Base Nadis : N= 9211)




Répartition en fonction du mode de contamination probable

(à partir de la Base Nadis N= 9211)




Autres * = transmission materno-foetal, hémophile, transfusion

Répartition en fonction du mode de contamination probable par département (à partir de la Base Nadis N= 9211)




Répartition en fonction du pays de naissance de la populations suivie (à partir de la Base Nadis : N= 9211)




Autres * = Amériques, Océanie, Europe, Moyen-Orient, Asie

Répartition en fonction du pays de naissance de la populations suivie (à partir de la Base Nadis : N= 9211)




Représentation de la coïnfection hépatite

(à partir de la Base Nadis N= 9211)



On a 1835 patients co-infectés hépatites se qui représente 19,9% de la file active

Cascade de la prise en charge dans les soins, en 2019





La cascade de la prise en charge dans les soins représente l'écart entre le nombre de personnes dépistées qui sont venues consulter dans un service de soins (1^o colonne), le nombre de celles qui restent dans le système de soins (2^o colonne), le nombre de celles qui prennent un traitement depuis plus de 6 mois (3^o colonne) et le nombre de celles qui ont un traitement efficace (4^o colonne). **La 5^o colonne montre le nombre de patients traités qui sont en très bonne santé.**

L'écart entre la 1^o et la 4^o colonne révèle les efforts à faire pour obtenir que toutes les personnes séropositives (à qui un traitement est proposé dès le diagnostic connu) aient une charge virale indétectable = succès thérapeutique.

Evolution et répartition des nouveaux diagnostiqués VIH en Occitanie


Répartition par département en 2019





* : En 20107, le COREVIH Occitanie hébergeait les données du Limousin

Répartition des nouveaux diagnostiqués en fonction du sexe


(à partir de la Base Nadis : N= 226)



Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction de l'âge (à partir de la Base Nadis : N=226)





Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction du mode de contamination probable (à partir de la Base Nadis : N=226)



Autre * = transmission materno-foetal, hémophile, transfusion

Répartition des patients nouvellement diagnostiqués en fonction du pays de naissance (à partir de la Base Nadis : N=226)



Autres * = Amériques, Océanie, Europe, Moyen-Orient, Asie

Répartition des patients nouvellement diagnostiqués au moment de leur prise en charge

(à partir de la Base Nadis : N=226)

